


LA QUALITÉ DE VIE

POUR LES PATIENTS SOUMIS OU AYANT
ÉTÉ SOUMIS AUX CHIMIOTHERAPIES,
RADIOTHERAPIES, HORMONOTHERAPIES,
CHIRURGIES REPARATRICES



***AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE VIE DES PATIENTS***



LA GAMME SPECIFIQUE DE SOINS DE SUPPORT EN ONCOLOGIE POUR LES HOMMES ET LES FEMMES :

Dispositifs médicaux et complément formulés avec des F.A.G (acides gras spécifiques brevetés....) pour pallier les effets secondaires des anti-cancéreux.
Tests dermatologiques et microbiologiques / sans cortisone, sans hormones, sans parfum, sans gluten, sans colorants, sans lactose.

QU'EST-CE-QUE LA CHIMIOTHÉRAPIE ?

- Lors d'une chimio, les médicaments toxiques sont administrés en vue de détruire les cellules malades.
- Le mécanisme d'action de ces « cytotoxiques » consiste à bloquer la phase de multiplication cellulaire.
- Une cellule tumorale incapable de se multiplier est condamnée à l'apoptose (mort).
- La chimio est parfois administrée par voie orale mais plus souvent dans la circulation sanguine (dans une veine) de cette manière on peut atteindre toutes les cellules cancéreuses du corps mais hélas peu sélective et s'attaque à toutes les cellules en prolifération rapide telles que : la peau, les muqueuses, les follicules pileux, les ongles, de la moelle osseuse etc..
- La chimio peut comprendre un seul médicaments ou plusieurs, cela dépend de plusieurs facteurs comme le diagnostic primaire, l'état physique du patient...Il peut y avoir plusieurs cycles mais toujours avec une pause entre les cycles pour que l'organisme du patient se remettre d'éventuels effets secondaires.
- La chimio : avant chirurgie (chimio primaire ou néoadjuvante) ou après chirurgie (chimio adjuvante)



QU'EST-CE-QUE LA RADIOTHÉRAPIE ?

- La radiothérapie utilise des sources d'énergie émettant des radiations pour détruire les cellules malades dans des régions bien délimitées.
- Ces radiations (types α , $\beta+$, $\beta-$, γ , X, électron, protons...) agissent en altérant l'ADN des cellules de manière à les tuer.
- Les radiations endommagent inévitablement des cellules saines situées à proximité de la lésion ou sur le parcours du faisceau radioactif, causant des effets secondaires tels que brûlures, dermatite, eczéma, vésicules et ulcérations.
- La gravité des dommages dépend de la dose, intensité, durée, type de traitements : radiothérapie interne ou externe, de l'étendue de la zone à traiter, de l'état général, âge du patient etc..
- La radiothérapie peut être préopératoire pour réduire la masse tumorale afin de limiter et d'optimiser la chirurgie, ou postopératoire afin de détruire les éventuelles cellules résiduelles après l'intervention.



SOMMAIRE

Présentation des 9 soins spécifiques de support en oncologie pour pallier les effets secondaires :

- Complément diététique spécifique :
 - OnLife comprimés
- Dispositifs médicaux spécifiques :
 - OnLife crème
 - RaLife crème
 - RaLife lait
 - OnicoLife vernis
 - EvaLife crème
 - OraLife gel
 - GenLife crème
 - GutLife crème





LES NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES CHIMIO-INDUITES (CIPN)

Picotements, engourdissements, brûlures, sensibilité thermique altérée, douleurs dans les mains et/ou les pieds...

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE SPÉCIFIQUE AUX NEUROPATHIES PÉRIPHÉRIQUES CHIMIO- INDUITES



**Comprimés
OnLife®**

**Contre les
sensations
anormales dans
les mains et les
pieds des
patients sous
chimiothérapie**

Indication : picotements, engourdissements, brûlures, sensibilité thermique altérée, douleurs dans les mains et/ou les pieds...

OnLife comprimés : 2 cp matin et 2 cp soir pendant 5 jours puis 1 cp matin et 1 cp soir jusqu'à diminution et/ou disparitions des symptômes.

Utilisation chez l'adulte / traitement de fond.

Sans gluten, sans lactose, sans colorants.

2 boites par mois jusqu'à diminution et/ou disparition des symptômes.

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)



**Crème
OnLife®**

**Contre les
sensations
anormales dans
les mains et les
pieds des
patients sous
chimiothérapie**

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Indication : picotements, engourdissements, brûlures, sensibilité thermique altérée, douleurs dans les mains et/ou les pieds...

OnLife crème : appliquer et répartir uniformément la crème sur main/pieds en une fine couche. Masser jusqu'à pénétration complète de la crème. Il est conseillé d'attendre au moins 15 à 20 minutes avant de rincer la zone traitée avec ce soin qui n'est pas gras et qui ne tache pas.

Action rapide sur l'amélioration des sensations tactiles en complément du comprimé OnLife.



COMMENT AIDER À SOULAGER LES PATIENTS ?

- Il est désormais possible de prévenir ou limiter une série d'effets indésirables touchant spécifiquement la peau et les muqueuses suite aux chimio ou radiothérapies et certains médicaments biologiques (traitements ciblés);
- La peau, le derme, les phanères (ongles, poils, cheveux) et les muqueuses (anale, génitale, buccale) sont régulés par un ensemble de cellules et mécanismes très précis, dont la fonction est de préserver l'équilibre délicat des diverses composantes afin d'assurer le fonctionnement physiologique des tissus et muqueuses. Le maintien d'un stimulus irritant, stress chimique, radioactif, thermique, chirurgicale, provoque une inflammation qui tend à amplifier les lésions tissulaires.
- Il est fondamental de limiter et contrôler l'inflammation localisée et de restaurer les conditions physiologiques, de façon à permettre la guérison des dommages subis.

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)



**Crème
RaLife®**

**Pour le soin de la
peau (Ex. sein,
peau enflammée)
des patients sous
traitement
anti-cancer**

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Indication : **RaLife crème**, pour le traitement en phase aiguë de régions cutanées irritées, rougies, enflées et douloureuses, visage, seins.... **Sans cortisone, sans hormones.**

Pendant une radiothérapie, appliquer **RaLife® Crème** sur la zone traitée au moins 4 heures avant la première exposition et pas moins de 2 heures après l'exposition sur une peau propre et sèche. Masser délicatement jusqu'à absorption complète et répéter l'application toutes les 6 heures. Pour toute autre utilisation, appliquer la crème sur la zone traitée 2 à 3 fois par jour en massant délicatement jusqu'à absorption complète. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à normalisation des tissus.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)



**Lait
RaLife®**

**Pour le soin de la
peau (Ex. sein,
peau enflammée)
des patients sous
traitement
anti-cancer**

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Indication : **RaLife Lait**, pour le traitement en phase chronique de région cutanées irritées, rougies, enflées et douloureuses, visage, seins, corps. **Sans cortisone, sans hormones.**

Pendant une radiothérapie, appliquer **RaLife® Lait** sur la zone traitée au moins 4 heures avant la première exposition et pas moins de 2 heures après l'exposition sur une peau propre et sèche. Masser délicatement jusqu'à absorption complète. Pour toute autre utilisation, appliquer la crème sur la zone traitée 1 à 2 fois par jour en massant délicatement jusqu'à absorption complète. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à normalisation des tissus.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES



Vernis OnicoLife®

**Pour le soin des
ongles des
patients sous
traitement
anti-cancer**

Indication : **OnicoLife vernis**, est indiquée pour le traitement des altérations des ongles douloureux, des ongles fragiles et striés chez les patients sous radiothérapie ou soumis à un stress thermique ou chimique.

Retirer le vernis/les faux ongles et appliquer sur l'ongle nu **OnicoLife®** avec l'applicateur prévu à cet effet de façon à ce que le produit adhère correctement sur toute la surface de l'ongle. Ne pas couvrir et laisser sécher. Maintenir une bonne hygiène. Répéter l'application **2 fois ou plus par jour** en fonction de la sévérité de l'atteinte. Ne pas se laver les mains juste après la pause du soin. Pour toute autre utilisation, appliquer OnicoLife® 2 fois par jour.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES



**Crème
EvaLife®**

**Pour le soin de la
muqueuse vaginale
des femmes sous
traitement
anti-cancer**

Indication : **EvaLife crème**, est indiquée pour le traitement des démangeaisons, des brûlures, des rougeurs et de la sécheresse au niveau de la vulve et de l'ouverture vaginale chez les patientes sous radiothérapie ou soumises à un stress thermique ou un stress chimique. **Sans cortisone, sans hormones.**

Pendant une radiothérapie, appliquer **EvaLife® Crème** après exposition, sur la zone traitée en massant délicatement jusqu'à absorption complète et répéter l'application toutes les 6 heures. Pour toute autre utilisation, appliquer la crème sur la zone traitée 2 à 3 fois par jour en massant délicatement jusqu'à absorption complète. L'application doit être poursuivie jusqu'à ce que les symptômes soient contrôlés.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)



**Gel
OraLife®**

**Pour le soin des
muqueuses
buccales des
patients sous
traitement
anti-cancer**

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Indication : **OraLife® Gel** est indiqué pour le traitement de symptômes associés à l'inflammation et à l'irritation des muqueuses buccales rouges, douloureuses, enflées et/ou sèches comme en cas de mucite, même chez les patients sous radiothérapie ou soumis à un stress thermique ou chimique. Goût agréable et subtil.

Pendant une radiothérapie, appliquer le gel sur la muqueuse buccale au moins 4h avant l'exposition à l'aide de la langue et/ou des doigts en effectuant un léger massage. Après l'exposition, appliquer le gel plusieurs fois par jour, selon les besoins. Pour toute autre application, appliquer **OraLife® Gel** 3 fois ou plus par jour, selon les besoins, sur la muqueuse buccale et masser délicatement avec la langue et/ou les doigts. Le traitement doit être poursuivi jusqu'à ce que les symptômes soient contrôlés. **Ne pas boire ni rincer la cavité buccale pendant au moins 30 minutes suivant l'application du gel.**

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES



**Crème
GutLife®**

**Pour le soin de la
muqueuse anale
des patients sous
traitement
anti-cancer**

Indication : Gutlife crème, est indiquée pour le traitement de symptômes associés à l'inflammation et l'irritation cutanées de la zone anale et périanale. Propriétés protectrices, lubrifiantes et apaisantes(acide hyaluronique). Sans cortisone, sans hormones, sans parfum.

Pendant une radiothérapie, appliquer GutLife® Crème après exposition, sur la zone traitée jusqu'à absorption totale puis toutes les 6 à 8 heures, en massant délicatement l'anus et la région périanale. Autre utilisation, appliquer sur la zone traitée 2 à 3 fois/j en massant jusqu'à disparition des symptômes. En cas d'examens rectaux manuels et/ou avec instruments, il est conseillé d'appliquer la crème sur la zone traitée 5 à 10 minutes avant et/ou après l'examen.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

Formulation novatrice reposant sur un complexe brevetée de F.A.G (Fatty Acids Groups+...)



**Crème
GenLife®**

**Pour le soin de la
région génitale
des hommes sous
traitement
anti-cancer**

DISPOSITIF MÉDICAL - TESTS DERMATOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES

Indication : **GenLife crème**, est indiquée pour le traitement des démangeaisons, des brûlures, des rougeurs et de la sécheresse au niveau du prépuce et du pénis chez les patients sous radiothérapie ou soumis à un stress thermique ou un stress chimique. **Sans cortisone, sans hormones, sans parfum.**

Pendant une radiothérapie, appliquer **GenLife Crème** après exposition, sur la zone traitée jusqu'à absorption complète puis **toutes les 6 heures**. Autre utilisation, appliquer la crème sur la zone traitée 2 à 3 fois par jour en massant jusqu'à absorption complète. L'application doit être poursuivie jusqu'à ce que les symptômes soient contrôlés.

Les soins constituent également un traitement adjuvant en phase post-infectieuse ainsi qu'en période post-opératoire

INFORMATIONS




INFO@NUTRACEUTICAL.FR



WWW.NUTRACEUTICAL.FR

nutraCeutical



Pour une meilleure qualité de vie